

УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА У ПОСТРАЖДАЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ

Танасієнко П.В.^{1*}, Ковалишин І.В.²

¹ Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінниця, Україна


² КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради, Городок, Львівська область, Україна

Адреса для листування: * radix.vn@ukr.net

Конфлікт інтересів: Відсутній

Мета: аналіз ускладнень лікування пацієнтів з переломами проксимального відділу стегна та політравмою з використанням різних хірургічних методик.

Матеріали і методи: Проведено аналіз 118 випадки переломів проксимального відділу стегна та політравми, що лікувались у КНП «Городоцька міська лікарня» за період 2013 по 2022 роки. Пацієнти були поділені на три групи в залежності від виконаного хірургічного втручання. До першої групи були віднесені 47 випадків переломів проксимального відділу стегна та політравмою, в яких було виконано остеосинтез кутовою пластиною. До другої групи були віднесені 44 пацієнт з переломами проксимального відділу стегна та політравмою, в яких було виконано остеосинтез блокуючим інтрамедулярним проксимальним стрижнем. До третьої групи були віднесені 27 випадків переломів проксимального відділу стегна та політравмою, в яких було виконано тотальне ендопротезування кульшового суглоба.



Висновок: У постраждалих після ендопротезування кульшового суглобу з приводу перелому проксимального відділу стегна в результаті політравми значно менше виявлялись локальні ускладнення у порівнянні з пацієнтами з іншими видами хірургічного лікування, а рівень загальних ускладнень був приблизно на тому ж рівні, що і у пацієнтів з іншими видами хірургічного лікування.