ПОШИРЕНІСТЬ КОМОРБІДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

Соколюк А.К., Ткачук І. М.

Українська військово-медична академія, кафедра військової загальної практики-сімейноїмедицини, м. Київ, Україна

e-mail: sokoluk0108@ukr.net; e-mail: iryna_tkachuk@i.ua. Автори не заявляють конфлікту інтересів

Мета: визначити поширеність коморбідних захворювань у військовослужбовців, хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), які перенесли гострий інфаркт міокарда.

Матеріали. Методом випадкової вибірки проведено аналіз 83 історій хвороби військовослужбовців, які були госпіталізовані в Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» в 2016-2020 роках з діагнозом інфаркт міокарда. Всі хворі були чоловічої статі, віком від 22 до 60 років (середній вік 48,5±4,35 років).

Методи. У дослідженні застосовано методи бібліографічний, статистичний, системного підходу та аналізу. Статистична обробка проводилась з використанням програми Microsoft Excel 2007 та стандартного статистичного пакета STATISTICA 6,0.

Результати дослідження. Визначено значну поширеність коморбідних захворювань у хворих ІХС, які перенесли інфаркт міокарда (рис.1)

Висновки: 1. Встановлено значне поширення коморбідної патології у військовослужбовців, хворих на ІХС, які перенесли інфаркт міокарда, що необхідно враховувати при розробці індивідуальних лікувально-профілактичних програм задля підвищення ефективності лікування і попередження ускладнень. Не визначено статистично достовірної різниці щодо частоти виявлення більшості коморбідних зазворювань у військовослужбовців у віковій групі молодше і старше 50 років.

2. Визначено, що у хворих на ІХС, які перенесли гострий інфаркт міокарда, з коморбідним цукровим діабетом / порушенням толерантності до глюкози, - атеросклероз двох і більше судинних басейнів було діагностовано у 88,2±7,8%, а у пацієнтів без порушення вуглеводного обміну – у 66,2±5,9% (p=0,02), що потребує уваги при проведенні вторинної профілактики.



Рис.1. Частота виявлення коморбідних захворювань у військовослужбовців, хворих на ІХС, які перенесли інфаркт міокарда